

Lungfunktionsprov Spirometri och bronkodilationsprov

Spirometriundersökningen är ett blåspröv, som mäter lungvolymen och utandningsluftens flödes hastighet. Undersökningen räcker 30-60 minuter och man skall alltid beställa tid på förhand.

Undersökningen görs inte vid infektion i andningsvägarna (t.ex. snuva) och inte heller inom två veckor efter infektion.

Före undersökningen

- 2 timmar utan att röka (gäller också elcigaretter)
- 4 timmar utan att dricka kaffe, te, coladrycker eller andra uppiggande ämnen samt ingen stadig måltid (dock inte helt utan mat).
- 1 dygn utan alkohol

Undvik också kraftig ansträngning ca 2 timmar före undersökningen.

Efter infektion i andningsvägarna kan undersökningen göras tidigast efter ca två veckor.

Medicinering

Remitterande läkare avgör om man skall hålla paus med några mediciner före undersökningen (läkemedelsförteckning på följande sida). Andra mediciner än sådana som ordinerats för sjukdomar i andningsvägarna (t.ex. hjärt- och blodtrycksmediciner) tas som normalt.

Förfrågningar och tidsbeställning:

Läkärikeskus Mehiläinen
Växel 010 414 0112
Kundbetjäning 010 414 00

Undersökningstid: Datum _____ Kl _____

Då man skall undersöka lungfunktionen utan läkemedelspåverkan, skall patienten vara utan medicin åtminstone den tid som anges nedan.

SYMPATOMIMETIKA
Korttidsverkande:

12 t Adrenalin, EpiPen
 Bricanyl
 Buventol
 Ventoline

Långtidsverkande:

48 t Formoterol
 Oxis
 Serevent

7 dygn Onbrez
 Striverdi

ANTI-KOLINERGIKA
Korttidsverkande:

24 t Atrovent

Långtidsverkande:

2 dygn Eklira
3 dygn Incruse
4 dygn Spiriva
12 dygn Seebri

ANTI-KOLINERG + SYMPATOMIMET
Korttidsverkande:

24 t Atrodual
 Atrovent comp
 Ipratropium/Salbutamol

Långtidsverkande:

48t Duakril
3 dygn Anoro
7 dygn Inspiolto
12 dygn Ultibro

LEUKOTRIEN-ANTAGONIST

3 dygn Accolate
 Montelukast
 Singulair

TEOFYLLINER

3 dygn Aminocont
 Retafyllin
 Theofol ja Theofol comp.

KORTIKOSTEROIDER

4 veckor (Om man vill undersöka ett fall där det sannolikt inte är steroidpåverkan)

4 veckor Alvesco
 Asmanex
 Beclomet
 Budesonid
 Flixotide
 Fluticason
 Hydrocortison *
 Medrol *
 Novopulmon
 Prednisolon *
 Prednison *
 Pulmicort
 Solomet *

* paus endast om medicinen är för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

KORTIKOSTEROID+LÅNGTIDSVERKANDE SYMPATOMIMET

Om man vill utesluta endast sympatomimetinverkan är tidsgränsen 48 t eller 72 t. Om man vill utesluta också steroidinverkan är tidsgränsen 4 veckor.

48 t eller 4 dygn Bufomix
 Flutiform
 Innovair
 Salflumix
 Salmeterol/Fluticason
 Seretide
 Symbicort

72 t eller 4 dygn Relvar

KORTIKOSTEROID + ANTI-KOLINERG + SYMPATOMIMET

3 eller 12 dygn, om man vill utesluta antikolinerg- och sympatomimetinverkan och 4 veckor om man vill utesluta även steroidinverkan.

3 dygn eller 4 veckor
 Trelegy

12 dygn eller 4 veckor
 Trimbow

NEDOKROMII

24 t Tilade

ÖVRIGA ANTI-INFLAMMATORISKA LÄKEMEDEL

5 dygn Daxas

HOSTMEDICINER

3 DYGN alla

EFEDRIN

12 t Efedrin